

บันทึกการใช้ยา Meropenem 1 g inj. โรงพยาบาลบ้านนา

(Drug Utilization Evaluation; DUE)

ชื่อ.....HN.....AN.....	
อายุ.....	น้ำหนัก.....Scr.....Clcr.....mL/min
Diagnosis.....วิธีใช้.....	
ยาปฏิชีวนะที่ใช้มาก่อน.....	
Site of infection ☐ Lung ☐ Urinary tract ☐ Skin & soft tissue ☐ joint ☐ CNS ☐ Intra-abdominal ☐ Other ระบุ.....	
แหล่งที่มาของเชื้อ ☐ Community acquired ☐ Hospital acquired	
การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ☐ Gram stain ☐ Urine c/s ☐ Hemoculture ☐ Sputum c/s ☐ Pus c/s ☐ Ascite c/s ☐ Synovial c/s ☐ Melioidosis titer ☐ Other ระบุ.....	
Indication ☐ Empiric therapy: ยังไม่รู้เชื้อสาเหตุ [] Septic shock or severe sepsis ที่สงสัย Nosocomial infection from MDR gram negative bacteria [] Septic shock or severe sepsis ที่เคยมีประวัติได้ยาในกลุ่ม 3 rd generation cephalosporins มาก่อนภายใน 3 เดือน [] อื่นๆ ระบุ..... ☐ Documented therapy ตรวจพบเชื้อ มีผลเพาะเชื้อพบ gram negative bacteria ที่ไวต่อ Meropenem เท่านั้น โดยพบเชื้อ.....จากการส่งตรวจ.....	
Dosage (Max dose 6 gm/day) hr Dose for adult ☐ 500 mg q 8 hr ☐ 1 g q 8 hr (Serious infection) ☐ 2 g q 8 hr (Meningitis) Dose for renal impairment ☐ Clcr 26-50 mL/min recommended dose q 12 hr ☐ Clcr 10-25 mL/min 50% recommended dose q 12 hr ☐ Clcr <10 mL/min 50% recommended dose q 24 hr - Dose for children ☐ Sepsis: 20 mg/kg per dose q 8 hr IV infusion over 30 minutes ☐ Meningitis: 40 mg/kg per dose q 8 hr IV infusion over 20 minutes	
Duration วันที่เริ่ม.....วันที่หยุดใช้.....รวม.....วัน	

ลงนามแพทย์ผู้สั่งใช้ยา.....วันที่...../...../.....

ลงนามแพทย์เฉพาะทางผู้ให้คำปรึกษา.....วันที่...../...../.....

หมายเหตุ

- เงื่อนไขในการส่งจ่ายยา ใช้ได้เมื่อปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเท่านั้น
- ราคายา Meropenem 1 g = 97 บาท/ขวด